



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

A anastomose do sistema carotídeo interno e externo se faz na região anterior do septo nasal, ou área de Little, e é chamada de plexo:

- A) Kiesselbach;
- B) Corióide;
- C) Cervical;
- D) Braquial.

QUESTÃO 12

A Rinossinusite Aguda (RSA) é infecciosa por natureza, enquanto a crônica é considerada multifatorial. Sobre a RSA, analise as afirmativas abaixo:

- I. Deve-se suspeitar de uma infecção bacteriana quando os sintomas de obstrução nasal e rinorreia purulenta persistem por mais de 10 dias ou apresentam piora significativa após o quinto dia de evolução;
- II. Não se deve solicitar exame radiológico quando o diagnóstico clínico de RSA foi estabelecido, salvo na suspeita de complicações ou quando há suspeita de outro diagnóstico associado;
- III. Os agentes etiológicos mais frequentes na grande maioria dos estudos, correspondendo a 70% das infecções, são o *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus beta-hemolítico*.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 13

Epistaxe é definida como qualquer sangramento proveniente da mucosa nasal, ou seja, é uma alteração da hemostasia nasal. Acerca deste tema, assinale a opção correta.

- A) O sistema da artéria carótida interna é o maior responsável pelo fluxo sanguíneo no nariz, pelos ramos maxilar e facial;
- B) Entre 90 e 95% dos sangramentos são classificados como posteriores, principalmente da área de Little;
- C) As epistaxes anteriores são mais raras, costumam ter prognóstico mais grave e acometem mais frequentemente os idosos;
- D) O trauma digital, isto é, o hábito de colocar o dedo no nariz, é o maior responsável pelos sangramentos nasais, principalmente em crianças.

QUESTÃO 14

A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é um dos distúrbios do sono mais amplamente investigados, em virtude da grande relevância clínica, por sua prevalência não desprezível e associação com grave morbidade. Sobre a SAOS, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Os sintomas dos pacientes apneicos podem ser agrupados em noturnos, mais específicos para SAOS, e diurnos, os quais podem estar presentes em diversos distúrbios do sono, independentemente da causa;
- () Os sintomas respiratórios obstrutivos da SAOS que incluem ronco, pausas respiratórias testemunhadas, episódios de sufocação e engasgos são as principais causas que levam o paciente a buscar um tratamento especializado;
- () Pirose e regurgitação são sintomas raros na SAOS;
- () A história familiar positiva não aumenta o risco para SAOS.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, V;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, F;
- D) F, V, F, V.

QUESTÃO 15

Criança, sexo masculino, 8 anos de idade, com história de roncos e respiração oral diurna e noturna desde os 2 anos, teve diagnóstico de hipertrofia adenoamidaliana realizado por seu otorrinolaringologista e foi submetido à adenoamidalectomia há cerca de sete meses. A mãe relata melhora dos roncos, porém a criança persiste com respiração oral. Neste caso a conduta mais adequada é:

- A) Solicitar nasofibroscopia para ver se houve recidiva da hipertrofia de tonsila faríngea;
- B) Solicitar avaliação de ortodontista e fonoaudiólogo, pois possivelmente a respiração oral é consequência de alterações miofuncionais e ortodônticas;
- C) Verificar se persiste algum fator obstrutivo e solicitar avaliação fonoaudiológica e ortodôntica;
- D) Conduta expectante, pois o paciente vai adaptando-se à nova condição respiratória e passa a apresentar respiração nasal espontaneamente.



QUESTÃO 16

Em relação às alterações estruturais mínimas (AEM), analise as afirmativas abaixo:

- I. As AEM são variações anatômicas da laringe que não alteram as suas funções básicas e que necessariamente tem repercussão na função fonatória;
- II. A proporção glótica feminina está associada à fenda triangular posterior, que predispõe as mulheres à formação do nódulo vocal, o que não ocorre no padrão masculino;
- III. As alterações estruturais mínimas de cobertura modificam a matriz extracelular e levam à perda de tecido ou a restrições na liberdade de movimentos da onda mucosa e, por isso, podem comprometer a qualidade da fonação;
- IV. O tratamento cirúrgico quase sempre é indicado tanto para a remoção das lesões secundárias quanto para a exérese do sulco bolsa.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 17

O termo laringite refere-se a todo processo inflamatório que acomete os tecidos da laringe, agride sua mucosa e acaba originando uma série de sintomas variáveis que alteram suas funções básicas. Acerca da laringite aguda, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- () Na laringite aguda, o quadro se inicia com sintomas típicos de infecção de vias aéreas superiores, com congestão nasal, febre (mais frequentes nas crianças), tosse e pigarro;
- () Em crianças, a laringite aguda costuma ser menos grave e a disfonia é o sintoma dominante nesta faixa etária;
- () A laringoscopia indireta é de grande importância no diagnóstico da laringite aguda; esta pode ser realizada com espelhos laringeos, fibra óptica flexível ou sistema de lentes rígidas;
- () Entre os principais tipos de laringite aguda, podem-se citar: laringotraqueíte aguda ou crupe viral, epigloteite, laringite estrudulosa, laringotraqueobronquite membranosa e laringite diftérica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 18

Os tumores iniciais da laringe compreendem uma variedade de neoplasias benignas e malignas que acometem a região glótica. Sobre este grupo de patologias assinale a opção correta:

- A) Na grande maioria dos casos, trata-se de pacientes do sexo masculino, na 5ª ou 6ª décadas de vida, tabagistas, com queixa de rouquidão de caráter insidioso e progressivo;
- B) Os tumores glóticos levam frequentemente a queixa de disfonia, sendo a dispneia e a disfagia sintomas associados e tardios, variando sua intensidade de acordo com o grau de acometimento supraglótico ou subglótico, respectivamente;
- C) Nos tumores subglóticos, a disfagia e a odinofagia são os sintomas usuais, inicialmente sem alterações vocais;
- D) O álcool é considerado o fator etiológico mais importante no câncer da laringe.

QUESTÃO 19

A otite média aguda (OMA) é uma das doenças mais frequentes na infância e permanece como um dos principais motivos de consultas pediátricas. Sobre a OMA analise as afirmativas abaixo:

- I. Para o diagnóstico de OMA ser firmado, o exame físico deve apresentar evidências claras de processo inflamatório em orelha média;
- II. Nos casos de OMA supurada, a membrana timpânica pode apresentar perfurações que, com o tratamento adequado, cicatrizam totalmente, sem sequelas auditivas em praticamente todos os casos;
- III. O tipo de agente etiológico não tem relação importante com a severidade dos quadros encontrados;
- IV. Se houver falha terapêutica com o esquema antibiótico inicialmente proposto após 72 horas (febre persistente ou otalgia severa) e o diagnóstico de OMA ainda se confirmar, deve-se modificar a medicação antimicrobiana.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) II, III e IV.



QUESTÃO 20

No exame físico, o emprego de diapasões fornece indícios seguros de comprometimento neurosensorial da audição. O teste onde o diapasão é colocado sobre a mastoide do paciente; o examinador oclui e abre o meato acústico externo (MAE), alternadamente, com o objetivo de testar o efeito provocado por essa oclusão é conhecido como:

- A) Teste de Weber;
- B) Teste de Rinne;
- C) Teste de Bing;
- D) Teste de Schwabach.


QUESTÃO 21

Uma eletrococleografia com alteração da relação percentual entre a amplitude do potencial de somação e do potencial de ação é patognomônica de:

- A) Schwannoma vestibular;
- B) Doença de Ménière;
- C) Labirintopatia metabólica;
- D) Cocleopatia imunomediada.

QUESTÃO 22

A audiometria tonal apresentada no quadro abaixo mostra uma perda de audição:



- A) Condutiva em frequências baixas;
- B) Neurosensorial em frequências baixas;
- C) Condutiva em sons agudos;
- D) Neurosensorial em sons agudos.

QUESTÃO 23

A fratura do osso temporal (FOT) decorre tipicamente de mecanismos de trauma de alta energia, como acidentes automobilísticos, mesmo nos dias atuais e com melhores aparatos de segurança. A respeito da FOT, assinale a opção correta:

- A) O trauma fechado causa menos de 50% das fraturas do osso temporal;
- B) Frequentemente, a fratura causa extenso defeito ósseo no tegmen ou antro, resultando em meningocele, meningoencefalocele e fistula líquórica;
- C) A perda auditiva condutiva ocorre após um traumatismo por impacto do osso temporal, apenas se houver fratura;
- D) A perda auditiva neurosensorial ocorre principalmente relacionada à fratura transversa, com ruptura da cápsula ótica e lesão do labirinto ósseo e do labirinto membranoso, levando a nistagmo, fistula perilinfática ou trauma acústico.

QUESTÃO 24

O sinal de Bell consiste na:

- A) Rotação do globo ocular para cima e para fora ao se solicitar que feche os olhos;
- B) Contração orbicular diminuída pelas mãos do examinador;
- C) Maior facilidade de abrir o olho do lado acometido ao se solicitar que o paciente permaneça com os olhos fechados enquanto se tenta abri-los;
- D) Diminuição da vibração das pálpebras do lado afetado quando se solicita que as mantenha fechadas.

QUESTÃO 25

O colesteatoma corresponde ao acúmulo de queratina esfoliada dentro da orelha média ou de qualquer área do osso temporal, originada a partir de epitélio escamoso queratinizado. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. Os colesteatomas primários desenvolvem-se a partir de retração da membrana timpânica, geralmente da porção flácida, sem antecedentes de otite média;
- II. A perda auditiva está presente no momento do diagnóstico em aproximadamente 50% dos pacientes e é diretamente proporcional ao grau de destruição do sistema tímpano-ossicular, sendo predominantemente do tipo neurosensorial;
- III. A otorreia é um sintoma frequente no momento do diagnóstico, geralmente não é profusa e tem como característica coloração amarelada e odor fétido típico, podendo conter raia de sangue.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 26**

A atresia coanal congênita é uma anormalidade rara, caracterizada por obstrução, uni ou bilateral, da abertura posterior da cavidade nasal. Em relação a este tema, assinale a opção correta:

- A) A atresia de coanas ocorre, teoricamente, por um erro na embriogênese entre a 15^a e a 23^a semanas de idade gestacional;
- B) A atresia coanal unilateral se apresenta, no recém-nascido, como um quadro de emergência, causando comprometimento agudo das vias aéreas, já que os recém-nascidos são respiradores nasais obrigatórios;
- C) A endoscopia nasal é considerada padrão-ouro no diagnóstico, pois avalia o grau de obstrução, localiza exatamente o seu sítio, define a constituição da placa atrésica e avalia a presença de outras malformações craniofaciais;
- D) Existem vários acessos e técnicas descritos para correção dessa malformação, os acessos mais empregados são o transpalatal e o transnasal endoscópico.

QUESTÃO 27

Sobre a sialadenite supurativa aguda, analise as afirmativas abaixo:

- I. Costuma haver edema doloroso agudo das glândulas salivares, com febre;
- II. Pode ocorrer em pacientes no período pós-operatório e em pacientes idosos com condições médicas crônicas;
- III. Os fatores de risco incluem desidratação, trauma, imunossupressão e fraqueza;
- IV. A pele que está sobre a parótida pode ser quente, sensível e edematosa.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I, II e IV;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 28

O diagnóstico da otosclerose é feito levando-se em consideração aspectos clínicos, audiológicos e de exames de imagem. Acerca deste tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Clinicamente, a otosclerose se manifesta como uma perda auditiva de evolução lenta e gradual;
- () A maioria dos pacientes inicia essa perda por volta dos 20 anos de idade, a qual geralmente evolui até os 30 ou 40 anos, quando ela se torna mais perceptível;
- () Na impedanciometria, a pesquisa do reflexo estapédico é de fundamental importância, pois, mesmo em estágios iniciais da otosclerose, esse reflexo vai estar presente, representando, assim, uma ótima ferramenta para a diferenciação entre a otosclerose e a síndrome da deiscência do canal semicircular superior.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F;
- B) F, V, F;
- C) F, F, V;
- D) V, F, V.

**QUESTÃO 29**

O Corpo Estranho (CE) tem maior prevalência na orelha externa, mas pode acometer também a média e, mais raramente, a interna. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O CE de orelha é mais prevalente na infância;
- II. Na maioria das vezes, o CE de orelha é assintomático ou pouco sintomático;
- III. Zumbido intenso, tontura ou vertigem e teste de Weber sugestivo alertam para a ocorrência de perda auditiva neurossensorial, necessitando de avaliação emergencial por audiometria;
- IV. No caso de baterias elétricas, deve-se fazer a lavagem com soro fisiológico e realizar a remoção o mais breve possível.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) I, II e III;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 30

Acerca da Surdez Súbita (SS), assinale a opção correta:

- A) A SS é definida por uma perda neurossensorial de pelo menos 50 dB em duas frequências consecutivas no exame audiométrico;
- B) Geralmente unilateral, a SS pode envolver ambas as orelhas em menos de 2% dos casos, e quando o faz, o acometimento se dá habitualmente de forma sequencial;
- C) Uma vez diante de um quadro de SS, mais de 50% dos casos apresentarão uma etiologia definida;
- D) O único exame diagnóstico, além da audiometria, universalmente realizado nos casos de SS é a Tomografia Computadorizada.

