



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 11**

A Doença Hemorroidária (DH) surge quando há congestão, dilatação e aumento dos corpos cavernosos do canal anal formando grandes emaranhados vasculares, submucosos e/ou subcutâneos, flexíveis, que se enchem de sangue, constituindo os mamilos hemorroidários. Sobre a DH, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os agravantes estão relacionados com hábitos defecatórios errôneos, tais como: insistência em evacuar todos os dias, esforçar-se para defecar em um determinado horário por conveniência ou forçar o esvaziamento total do conteúdo retal de uma só vez;
- II. Não há remissão espontânea para a doença hemorroidária; uma vez manifestada e sem tratamento, sua evolução é progressiva;
- III. A dor retal é o principal sintoma, além de ser o mais frequente e, às vezes, o primeiro a manifestar-se;
- IV. O tratamento clínico pode ser indicado quando a doença hemorroidária acarreta sintomas discretos e esporádicos ao paciente, com longos períodos de acalmia.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 12

Acerca da Fissura Anal, assinale a opção correta:

- A) Caracteriza-se por uma lesão ulcerada linear situada na anoderma do canal anal, que geralmente ultrapassa a linha pectínea e a anocutânea;
- B) Sua localização predominante é na região anterior do canal anal;
- C) O fator traumático é considerado o mais importante e relacionado com o esforço evacuatório, a constipação intestinal crônica, a passagem de fezes endurecidas ou diarreicas e o uso de papel para higiene local;
- D) Na fissura anal aguda, cujo componente fisiopatológico principal é a hipertonia intensa do músculo esfíncter anal interno, a melhor conduta é a cirúrgica.

QUESTÃO 13

A cripta anal predispõe-se aos traumatismos no canal anal por causa de sua forma anatômica e da fragilidade de suas paredes, fatos que facilitam a infecção. Sobre a criptite, analise as afirmativas abaixo:

- I. Caracteriza-se por desencadear desde discreto ardor até dor na região anal;
- II. A anoscopia, quando possível, ou seja, quando a dor durante sua realização for suportável pelo enfermo, poderá mostrar congestão, enantema e edema em uma região da linha pectínea;
- III. As criptites agudas, com frequência, não têm regressão espontânea.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 14

Os abscessos são processos infecciosos agudos, supurativos, caracterizados por coleções purulentas na região anorretal. Sobre esta patologia, assinale a opção correta:

- A) Sua etiologia principal é a criptoglandular, pela infecção de uma cripta anal e conseqüente contaminação glandular;
- B) Os abscessos submucosos são os de diagnóstico, em geral, mais fácil, os mais frequentes, menos agressivos e de tratamento cirúrgico mais simples;
- C) Naqueles pacientes com diagnóstico difícil ou duvidoso, deve-se efetuar ultrassonografia pélvica, exame padrão-ouro para demonstrar a presença de abscessos e/ou trajetos fistulosos;
- D) O tratamento dos abscessos anorretais é essencialmente clínico.

**QUESTÃO 15**

As Fístulas Perianais são caracterizadas por um ou mais trajetos que comunicam o canal anal e/ou o reto (mucoso) ao períneo (cutâneo). Em relação a este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () No canal anal, é onde se localiza o orifício interno do trajeto da fístula e, no períneo, o orifício externo;
- () A fístula é denominada completa quando é possível reconhecer seu orifício externo (cutâneo), o trajeto fistuloso e o orifício interno, geralmente na cripta anal comprometida;
- () Os pacientes referem, frequentemente, dor anorretal latejante, com a presença ou não de um abscesso anorretal prévio;
- () A ultrassonografia endorretal apresenta boa especificidade, porém o padrão-ouro é a fistulografia.

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, V;
- B) V, V, V, F;
- C) F, V, V, F;
- D) F, V, F, V.

QUESTÃO 16

As dermatites perianais, a despeito da patogenia diversa, têm manifestações clínicas semelhantes, sendo o prurido anal seu sintoma mais evidente. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Manifesta-se de maneiras variáveis, continuamente ou com períodos de acalmia e paroxismos, geralmente mais intensos à noite;
- II. Na presença de uma dermatite perianal liquenificada (crônica), o prurido anal poderá ser intenso e provocar insônia, ansiedade e depressão;
- III. Na presença de prurido anal intenso, podem-se indicar anti-histamínicos orais para seu alívio.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 17

Os tumores benignos colorretais (TBCR) são, em sua maioria, de origem epitelial e, pelas suas consequências, representam o mais importante grupo dessas afecções. Sobre os TBCR, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Os pólipos adenomatosos e o papiloma viloso apresentam-se de formas diferentes na aparência microscópica, porém são decorrentes do mesmo processo patológico;
- () O hamartoma é definido como um tumor não neoplásico, formado pela proliferação anormal de tecido normal, disposto de forma desorganizada, não existindo qualquer evidência de que representa alterações pré-cancerosas;
- () O pólipos linfóide benigno é mais frequentemente encontrado no terço proximal do reto;
- () Os pólipos metaplásicos, ou hiperplásicos, são bastante frequentes no reto e achado comum em exames retossigmoidoscópicos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, V;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, F;
- D) F, V, F, V.

QUESTÃO 18

Em relação aos fatores de risco dos tumores malignos colorretais (TMCR), assinale a opção correta:

- A) A incidência dos TMCR aumenta significativamente após a idade de 20 anos, e cerca de 90% dos casos ocorrem em indivíduos acima de 30 anos;
- B) Os pólipos inflamatórios (hiperplásicos) representam fator de risco importante;
- C) É recomendável que pessoas com dois ou mais familiares com TMCR sejam orientadas a realizarem colonoscopia de controle a partir da idade de 50 anos, mas apenas se houver sintomas;
- D) O risco dos TMCR na doença de Crohn é baixo.



QUESTÃO 19

Obstrução intestinal é uma das causas mais frequentes de emergência. Acerca deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Na obstrução mecânica, há um distúrbio da força propulsora da musculatura intestinal;
- II. A causa da obstrução, embora, naturalmente, muito importante, não é o alvo principal da investigação inicial, já que o diagnóstico da obstrução é mais importante que o diagnóstico da causa da obstrução;
- III. As causas mais frequentes de obstrução são: hérnia externa, bridas, câncer, invaginação e hérnia interna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 20

Sobre a doença diverticular do cólon (DDC), analise as afirmativas abaixo:

- I. Quanto à localização, a DDC pode ocorrer em qualquer parte do cólon, mas acima de 95% dos casos ocorrem no descendente e sigmoide;
- II. Nos pacientes com DDC não complicada, o principal sinal é a hemorragia digestiva baixa;
- III. O mecanismo de formação da diverticulite é semelhante ao da apendicite, ou seja, o divertículo é obstruído por fezes endurecidas que provocam abrasão da mucosa do saco diverticular;
- IV. Ultrassonografia e o enema opaco constituem, hoje, exames de primeira escolha para o diagnóstico de diverticulite por se tratar de métodos não invasivos e de alta resolução.

Estão corretas, apenas:

- A) Apenas I e III;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I, II e IV;
- D) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 21

A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio funcional do trato digestivo para o qual não se demonstrou, até o momento, qualquer alteração metabólica, bioquímica ou estrutural da(s) víscera(s) envolvida(s), expressando-se através da acentuação, inibição ou simplesmente modificação da função intestinal. Sobre a SII, assinale a opção correta:

- A) Ocorre menos comumente em grupos etários mais jovens (15 a 44 anos) do que naqueles com idade mais avançada (45 anos ou mais);
- B) A colonoscopia deve ser sempre realizada quando houver suspeita de SII;
- C) Os ansiolíticos podem ser prescritos para alguns pacientes com SII pela frequência dos sintomas de ansiedade e relato de agravamento do quadro intestinal desencadeado por fatores emocionais;
- D) Os tricíclicos devem ser utilizados em pacientes com constipação intestinal predominante, pelo alívio do quadro.

QUESTÃO 22

A gangrena de Fournier é uma fasciite necrosante sinérgica do períneo e parede abdominal, que tem origem no escroto e pênis, no homem, e vulva e virilha, na mulher. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Atinge preferencialmente pacientes imunossuprimidos, portadores de diabetes mellitus, senis, alcoolistas e obesos;
- II. Manifesta-se inicialmente por dor ou prurido na região genitoperineal, acompanhada de febre alta e mal-estar geral, seguindo-se de edema local, crepitação e saída de secreção purulenta;
- III. O diagnóstico é clínico e deve ser precoce e seu tratamento, além de imediato, deve ser agressivo e com suporte intensivo;
- IV. Apresenta baixa mortalidade.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) III e IV;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.



QUESTÃO 23

Incontinência fecal (IF) é a perda da capacidade voluntária de reter o conteúdo intestinal. Acerca deste tema, assinale a opção correta:

- A) A incontinência fecal é resultante do enfraquecimento e/ou destruição, total ou parcial, da musculatura pélvica, podendo associar-se a: neuropatia do nervo pudendo; alterações do ângulo anorretal; sequelas de traumas cirúrgico ou consequente a doenças inflamatórias;
- B) Os casos onde há perda de fezes formadas, são chamados de incontinência parcial;
- C) A retossigmoidoscopia não está indicada na IF;
- D) A maioria dos enfermos com incontinência fecal é tratada cirurgicamente.

QUESTÃO 24

Em relação ao Carcinoma epidermoide do canal anal, assinale a afirmativa correta:

- A) Sua maior incidência está entre a 3ª e a 4ª décadas de vida, com predomínio no sexo feminino;
- B) Os basaloides ou cloacogênicos ocupam o primeiro lugar em incidência e são originários do epitélio de transição existente no canal anal, sendo, por isso, pouco diferenciados;
- C) Os tumores epidermoides do canal anal se propagam, com frequência, por continuidade e/ou por metástases linfáticas e, menos, pela via hematogênica;
- D) A invasão da loja prostática é mais comum que a da mucosa vaginal.

QUESTÃO 25

A retocolite ulcerativa (RCU) e a doença de Crohn (DC) são doenças inflamatórias crônicas idiopáticas e heterogêneas, comuns também entre crianças e adolescentes, constituindo cerca de 25% dos casos de doença inflamatória intestinal (DII). Sobre este tema assinale a opção correta:

- A) A RCU pode afetar qualquer área do intestino e tipicamente, há áreas descontinuamente afetadas (lesões em salto);
- B) A dor abdominal é o sintoma mais comum da RCU, geralmente em caráter de cólica, intensa e mais presente do que na DC;
- C) A doença perianal é observada em 15 a 40% dos pacientes e pode se destacar como a primeira manifestação da DC;
- D) As manifestações extraintestinais da DC são bastante raras.

QUESTÃO 26

Constipação intestinal (CI) não é uma doença, mas meramente um sintoma. Acerca da CI, analise as afirmativas abaixo:

- I. De uma maneira simplista, CI é definida como a evacuação intestinal abaixo de 6 vezes/semana;
- II. A ocorrência de constipação intestinal diminui muito após os 60 anos;
- III. Um grande número de drogas, por diversos mecanismos, pode induzir a constipação intestinal como antiácidos (à base de cálcio e alumínio) e antiarrítmicos;
- IV. Constipação intestinal de início recente sugere doença orgânica, e, nesse caso, devem-se ter sempre em mente patologias malignas, uma história de sintomas há mais de 2 anos é mais tranquilizadora.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) III e IV;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 27

A principal complicação do Megacólon Chagásico é:

- A) Fecaloma;
- B) Volvulo do sigmoide;
- C) Úlcera intestinal;
- D) Perfuração intestinal.

QUESTÃO 28

A diarreia é manifestação frequente para muitos pacientes com AIDS. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () De início, realiza-se o exame de fezes, que compreende pesquisa de bactérias, fungos, protozoários, helmintíases, leucócitos fecais, toxina do *Clostridium difficile* e coprocultura;
- () Se a análise do material fecal for negativa, deve-se iniciar tratamento empírico já que a investigação endoscópica não está indicada;
- () Durante a colonoscopia ou retossigmoidoscopia, mesmo se a mucosa tiver um aspecto normal, múltiplas biopsias aleatórias são colhidas na tentativa de isolar um agente específico.
- () O Citomegalovírus (CMV) é o principal agente responsável pelas colites.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, V;
- B) V, V, V, F;
- C) F, V, V, F;
- D) F, V, F, V.



QUESTÃO 29

Em relação às Helminthiases, assinale a opção correta:

- A) A tendência migratória do *Necator americanus*, favorece a entrada nas vias biliar e pancreática, causando icterícia obstrutiva com colangite, ou pancreatite aguda;
- B) Na ascariíase, quadros de obstrução intestinal, um aspecto tipo “miolo de pão” na topografia das alças do delgado sugere a possibilidade da etiologia da obstrução;
- C) Na estrogiloidiase o prurido anal é o sintoma mais intenso;
- D) O *Trichocephalus trichiuris* tem o corpo constituído de vários segmentos – os proglotes – com grau de maturidade variável, a partir da cabeça ou escólex.

QUESTÃO 30

A causa mais frequente de Hemorragia Digestiva Alta é:

- A) Varizes esofagogástricas;
- B) Tumores;
- C) Malformações arteriovenosas;
- D) Doença ulcerosa péptica.

